

FICHA TÉCNICA

INGREDIENTE ACTIVO: Metomilo

NOMBRE QUÍMICO: S-metil N-(metilcarbamoilo)Tioacetimidato

GRUPO QUÍMICO: Carbamato

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN: 90%, 900 g de i.a/Kg. Polvo Soluble

MODO DE ACCIÓN: Contacto e ingestión

REGISTRO SANITARIO: RSCO-INAC-0146-350-003-090

TOXICIDAD: Categoría II, Peligro.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

KUIK 90% PS es un insecticida de amplio espectro y de corto efecto residual. Interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	Dosis g/Ha
Alfalfa (7)	Chicharrita (<i>Aceratagallia curvata</i>), Chinche apestosa (<i>Euschistus servus</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades</i> sp.), Chinche lygus (<i>Lygus</i> sp.), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano verde (<i>Colias eurytheme</i>), Periquito (<i>Spissistilus festinus</i>), Picudo egipcio (<i>Hypera brunneipennis</i>), Pulga saltona negra (<i>Spanagonichus albofasciatus</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>), Pulgón manchado (<i>Therioaphis maculata</i>), Pulgón myzus (<i>Myzus persicae</i>), Pulgón azul (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	300-350
Algodonero (10)	Chinche lygus (<i>Lygus lineolaris</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano bellotero (<i>Heliothis virescens</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Gusano perforador (<i>Bucculatrix thurberiella</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> spp.)	300-400
Avena, Cebada, Centeno, Trigo (7)	Pulgón de la espiga (<i>Macrosiphum avenae</i>)	400
Betabel (3)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	350-400
Brócoli (3)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposa blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	350-400
Cacahuete (21)	Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	300-400
Calabaza (3)	Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp), Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>)	300-400
Chícharo (10)	Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp.), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	300-350
Chile (3)	Barrenillo del chile (<i>Anthonomus eugenii</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	300-400
Cítricos (1)	Gusano perro (<i>Papilio cresphontes</i>), Trips (<i>Frankliniella insularis</i>)	27-36 g/100 L agua
Col (1)	Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consuetata</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposa blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	300-40
Coliflor (3)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposa blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	300-400
Espárrago (1)	Chicharritas (<i>Empoasca</i> sp.), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	300-350

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	Dosis g/Ha
Fresa (15)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	350-400
Frijol (14)	Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	300-350
Frijol ejotero (1)	Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	300-400
Jitomate (1)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>), Gusano del cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	300-400
Lechuga (7)	Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	350-400
Maíz (3)	Barrenador (<i>Diatraea</i> sp.), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>)	250-500
Melón (3)	Barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>), Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp.)	300-400
Papa (14)	Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.)	300-400
Pepino, Sandía (3)	Barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>), Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp.), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>)	300-400
Sandía (3)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>)	300-400
Sorgo (14)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>), Gusano telarañero (<i>Nola sorghiella</i>), Mosca midge (<i>Contarinia sorghicola</i>), Pulgón verde del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	350-400
Soya (14)	Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano de la vaina (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	300-400
Tabaco (14)	Diabrotica (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano del cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i> , <i>Manduca sexta</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano de la yema (<i>Heliothis virescens</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Picudo (<i>Trichobaris championi</i>)	300-350

() Intervalo de seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

No permita la reentrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 72 horas de aplicado el producto.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.