

FICHA TÉCNICA

INGREDIENTE ACTIVO: Abamectina (Avermectina)

NOMBRE QUÍMICO: Mezcla de avermectinas B1, con no menos de 80% de avermectina B1a y no más de 20 % de avermectina B1b.

GRUPO QUÍMICO: Avermectinas, lactona macrocíclica

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN: 1.8%, 18 g de i.a/L. Concentrado Emulsionable.

MODO DE ACCIÓN: Por contacto e ingestión. Interfiere con la transmisión neural y neuromuscular, ácaros o insecto se paralizan, no se alimentan ni ovipositan y mueren en un corto tiempo.

REGISTRO SANITARIO: RSCO-INAC-0174-320-009-002

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica 4. Precaución.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Este producto tiene actividad translaminar. Al ser aplicado penetra en el tejido de las hojas formando un depósito de ingrediente activo, proporcionando una actividad residual contra las plagas que se alimentan del follaje, las cuales son afectadas al ingerir el producto.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	Dosis L/ha
Jitomate (10)	Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	0.5- 0.75
Jitomate (3)	Piojillo de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.5-0.75
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	100 mL/100 L de agua
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza pusilla, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii</i>)	0.5-1.00
	Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.3-1.0
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.0

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	Dosis L/ha
Fresa (3)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.72
	Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>)	0.5-1.2
Crisantemo (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.0
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	100 mL/100 L de agua
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i> , <i>Liriomyza</i> sp.)	0.5-1.0
Aguacatero (14)	Araña cristalina (<i>Oligonychus perseae</i>)	50-150 mL/100 L de agua
	Araña café (<i>Oligonychus punicae</i>)	0.5-1.0
Algodonero (20)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.5-1.2
	Araña roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	
Apio (3)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> sp.)	0.3-1.2
Berenjena (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.5-1.2
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Calabaza Calabacita, Melón, Pepino (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>)	0.6-1.2
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.6-1.25

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	Dosis L/ha
Chile (SL)	Paratrioza o pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.5-0.75
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.6-1.0
	Mosquita minadora (<i>Liriomyza trifolii</i>)	
	Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.75-1.0
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.0
Chile bell (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	0.6-1.0
	Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	
Cítricos (7)	Arador negrilla (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.4-1.5 L/ha + 0.25% de aceite mineral agrícola
	Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	
	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	0.4-1.5
Minador de los cítricos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)		
Rosal (SL)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	0.5-1.0 L/ha ó 50-100 mL/100 L de agua
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.3-0.5
	Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>)	50 mL/10 L de agua

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	Dosis L/ha
Clavel, Gerbera (SL)	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 mL/10 L de agua
	Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>)	
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	0.5-1
Mango (28)	Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	0.75-1.0
Manzano (28)	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.0
Papa (3)	Piojillo de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.5-0.75
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.5-1.25
	Mosquita minadora (<i>Liriomyza trifolii</i>)	0.5-1.0
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Peral (28)	Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	0.75-1.0
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.0
Sandía (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda, Liriomyza sp.</i>)	0.6-1.0
Tomate de cáscara (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.5-1.25
	Araña de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	

() Intervalo de seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

No permita la reentrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.